

Maks.: 2 ind. 15.5.1988 og 20.5.1997.

Høst: Registrert i perioden
20.9–9.10 (hhv. 1996 og 1990).

Maks.: 3 ind. 1.10.1999.

Det første funnet på Utsira, 6.10.1934, blir regnet som det første sikre funnet i Norge.

Dvergspurv *Emberiza pusilla*

To vårfunn. Opptrer normalt hver høst med én–fire individer, hovedsakelig i månedsskiftet september–oktober. Høyeste sesongtotaler er minst 13, 8 og 7 individer (hhv. 1994, 1998 og 1984). Høsten 1994 ble arten registrert regelmessig fram til midten av oktober, før enkeltindivider ble notert 3.–8. og 27.11, forut for sluttnoteringen 1.12. Med unntak av denne sesongen, er seineste høstregistrering 3.11 (i 1984). Det tidligste høstfunnet 13.9 er fra et år med kun ett individ registrert. Arten er mer regelmessig på Utsira enn på noen annen trekkfugllokaltet i Norden. Dvergspurv påtreffes mange steder på Utsira, men ser ut til å trives godt i tilknytning til grøftekanter og andre litt fuktige områder med høy gressvegetasjon i nærheten av beitemark.



Dvergspurv *Emberiza pusilla*, Rabbadalen, september 1994. Foto: Magne Klann.

Vår:

1 ind. 23.4.1981.
1 ind. 6.6.2002.

Høst: Registrert i perioden
13.9–1.12 (hhv. 1995 og 1994).

Maks.: 4 ind. 3.10.1998.

Det første funnet på Utsira, 16.9.1936, er det andre i Norge (og det første utenfor Øst-Finnmark). De påfølgende to funnene på øya, 5.10.1936 og 21.9.1937, er det tredje og fjerde i landet.

Kastanjespurv *Emberiza rutila*

Ett funn:

1 ind. (1K hann) 13.–15.10.1974.

Fuglen ble oppdaget om lag kl. 12:00 i følge med to gråspurv på en potetåker i den østlige delen av Kutrejordene. Fuglen holdt seg for det meste godt skjult i vegetasjonen, men fløy tidvis opp i trærne i den nærmeste hagen i Herberg. Den

lettet etter 15 min. og dro mot nord før den returnerte og fortsatte umiddelbart mot øst. Dagen etter ble den gjenfunnet kl. 14:30 i en stor møkkdyngge ved den østligste låven på Austrheim. Her ble den fanget inn for fotografering og ringmerking. Den ble sluppet løs på Skare kl. 08:30 påfølgende morgen, og ble ikke sett igjen.

Dette er det første funnet av denne sentralasiatiske arten i Norge, og det andre antatt spontane i Europa.

Sibirspurv *Emberiza aureola*

Tretten funn: ett i juni, og de resterende i perioden 31.8–28.9 (hhv. 1998 og 1979). De fleste funnene er sentrert rundt 17.9. Tatt i betraktning den regelmessige forekomsten av denne arten på Fair Isle (gjennomsnittlig tre–fire funn i året), er det ikke overraskende at det foreligger såpass mange funn fra Utsira. Flere av sibirspurvvene har hatt tilhold på kål- og potetåkre i Siradalen. Alle høstfunn på Utsira antas å dreie seg om ungfugler.

1 ind. 15.9.1972.
1 ind. 17.9.1975.
1 ind. 17.–18. og 28.9.1979*.
1 ind. (hunn) 24.6.1980.
1 ind. 17.–18.9.1980**.
1+1 ind. 21.–22.9.1985.
1 ind. 11.9.1993.
1 ind. 17.–18.9.1993.
1 ind. 7.9.1994.
1 ind. 5.9.1995.
1 ind. 18.9.1995.
1 ind. 31.8.1998.



Sibirspurv *Emberiza aureola*, Skjeldemarkje, september 1980. Foto: Jan Magnus Reneflot.



Sibirspurv *Emberiza aureola* (t.v.) og *dvergspurv* *E. pusilla* fanget samtidig på Herbergjordene, september 1985. Foto: Ove Bryne.



Sibirspurv *Emberiza aureola*, Skjeldemarkje, september 1994. Foto: Atle Grimmsby.